

**TRAITEMENT  
ARTHROSCOPIQUE  
DES FRACTURES DE  
L'EMINENCE  
INTERCONDYLIENNE  
CHEZ L'ADOLESCENT**

**VILLA ITALO  
MALBERTI RODOLFO  
COMMANDRE FRANCISQUE**

**TYPE  
D'ACCIDENT**

**- Hyperextension avec  
rotation interne**

**- Hyperextension avec  
rotation externe et  
valgus forcé**

**CLASSIFICATION**

**SELON**

**HOFFMAN**

**1- Fracture sans déplacement**

**2- Fracture avec déplacement,**

**mais encore avec contact avec le  
lit osseux**

**3- Fracture avec déplacement,**

**mais sans contact avec le plateau  
tibial**

**TRAITEMENT  
CHIRURGICAL**

**Toujours dans les  
lésions du groupe 3**



# **Intervention en arthroscopie**

**-Parfaite réduction**

**-Agression chirurgicale  
minime**

**Cas traités**

**9 patients âgés entre  
10 et 15 ans**

# **Technique chirurgicale**

**Lavage de  
l'hémarthrose et  
nettoyage soigné du  
lit de fracture du  
caillot**

**Traitement  
post-  
chirurgical**

- **genouillère plâtrée: 30 jours**
- **30 jours après éliminer le plâtre et les fils de K**
- **rééducation intensive**
- **charge: 40 jours après**



- guérison dans tous les cas traités**
- aucune migration en articulation des fils de  $K$**
- récupération complète**

# Résultats